

붙임 2) 변경대비표

레보도파 · 카르비도파 복합제(정제)
허가사항 변경대비표

구분	기 허가사항	변경사항
사용 상의 주의 사항	<p>3. 이상반응</p> <p>1) ~ 11) <생략></p>	<p>3. 이상반응</p> <p>1) ~ 11) <좌동></p> <p><u>12) 시판 후 사용에서, 도파민 수용체 작용제 및/또는 기타 도파민성 약제 투여 후 그리고 드물게 이 약을 포함하는 레보도파 제제 투여 후 병적 (강박적) 도박, 성욕 증가, 성욕 과다, 강박적 소비/지출, 폭식 및 강박적 음식 섭취가 보고되었다.</u></p>
	<p>4. 일반적 주의</p> <p>1) ~ 4) <생략></p> <p>5) 레보도파 또는 도파민 수용체 작용제를 투여한 파킨슨병 환자에서 병적 도박, 병적 성욕 항진 등의 충동 제어 장애가 보고되었으므로 이러한 증상이 나타나면 감량 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.</p>	<p>4. 일반적 주의</p> <p>1) ~ 4) <좌동></p> <p><u>5) 환자에게 충동 조절 장애가 나타나는지 정기적으로 모니터링 해야 한다. 도파민 수용체 작용제 및/또는 다른 도파민성 약제를 투여한 파킨슨병 환자에서 충동 조절 장애의 행동적 증상 (예, 병적 도박, 성욕 과다, 성욕 증가, 강박적 소비/지출, 폭식 및 강박적 음식 섭취)이 보고되었으므로 환자 및 의사가 이를 인지하여야 한다. 이러한 증상이 나타나면 이 약 투여를 검토하여야 한다.</u></p>
	<p>5. 상호작용</p> <p>1) 다음의 약들과 병용투여시 작용이 감소될 가능성이 있으므로 병용할 경우에는 신중히 투여한다 : 레세르핀 유도체(뇌의 도파</p>	<p>5. 상호작용</p> <p>1) <u>도파민을 감소시키는 약물 (예, 레세르핀, 테트라베나진) 또는 저장된 모노아민을 감소시키는 약물은 이 약의 작용을 감소시</u></p>

	<p>민양을 감소시킨다.)</p> <p>2) 혈압강하제, 특히 메칠도파, 레세르핀, 신경절차단제 등과 병용투여할 경우에는 이들 약물의 작용을 증강시킬 수 있으므로 신중히 투여한다(증후성 및 기립성 저혈압이 나타날 수 있다.).</p> <p>3) ~ 6) <생략></p>	<p><u>킬 수 있으므로 이 약과의 병용 투여는 권장 되지 않는다.</u></p> <p>2) 혈압강하제, 특히 메칠도파, 신경절차단제 등과 병용투여할 경우에는 이들 약물의 작용을 증강시킬 수 있으므로 신중히 투여한다(증후성 및 기립성 저혈압이 나타날 수 있다.).</p> <p>3) ~ 6) <좌동></p>
--	--	--