

파록세틴염산염(수화물) 단일제(정제)
허가사항 변경대비표

구분	기 허가사항	변경사항
용법 용량	<p>용량 :</p> <p>○ 성인 :</p> <p>1. ~ 2. <생략></p> <p>3. 공황장애</p> <p>경구투여시 권장투여량은 파록세틴으로서 1일 40 mg이다. 1일 10 mg으로 치료를 시작하고 환자의 반응에 따라 매주 10 mg씩 증량할 수 있다. 환자에 따라서는 1일 투여량을 최대 50 mg까지 증량하여야 한다. 일반적으로 공황장애는 치료초기에 증상이 악화될 가능성이 있다고 알려져 있으므로 초기 용량은 저용량으로 할 것을 권장하고 있다.</p> <p>4. 범불안장애(GAD)</p> <p>경구투여시 권장 투여량은 파록세틴으로서 1일 20 mg이다.</p> <p>5. ~ 6. <생략></p> <p>○ 고령자 : 고령자에서는 이 약의 혈중농도가 높게 나타날 수 있다. 성인의 초기투여량으로 치료를 시작해야 하며 환자의 반응에 따라 단계적으로 주당 10 mg씩 증량하며 1일 최대용량은 40 mg이다.</p> <p><이하 생략></p>	<p>용량 :</p> <p>○ 성인 :</p> <p>1. ~ 2. <좌동></p> <p>3. 공황장애</p> <p>경구투여시 권장투여량은 파록세틴으로서 1일 40 mg이다. 1일 10 mg으로 치료를 시작하고 환자의 반응에 따라 매주 10 mg씩 증량할 수 있다. 환자에 따라서는 1일 투여량을 최대 60 mg까지 증량하여야 한다. 일반적으로 공황장애는 치료초기에 증상이 악화될 가능성이 있다고 알려져 있으므로 초기 용량은 저용량으로 할 것을 권장하고 있다.</p> <p>4. 범불안장애(GAD)</p> <p>경구투여시 권장 투여량은 파록세틴으로서 1일 20 mg이다. <u>이 용량에 반응을 보이지 않는 환자는 단계적으로 매주 10mg씩 증량하여 1일 투여량을 최대 50mg까지 증량할 수 있다.</u></p> <p>5. ~ 6. <좌동></p> <p>○ 고령자 : 고령자에서는 이 약의 혈중농도가 높게 나타날 수 있다. <u>초기권장용량은 10mg/일이며,</u> 환자의 반응에 따라 단계적으로 주당 10 mg씩 증량하며 1일 최대용량은 40 mg이다.</p> <p><좌동></p>